

Mitochondrien-AK M2 (Serum)

Stand: 05.09.2017

Einheit: IU/ml

MethodeFEIA, UniCAP, [Anti-M2_Dez_2020.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		< 4 IU/ml normal
		4 - 6 IU/ml grenzwertig
		> 6 IU/ml positiv

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

PBC-bezogene Antikörper gegen Mitochondrien reagieren mit Untereinheiten des 2-Oxosäure-Dehydrogenase-Komplexes (2-OADC) und erkennen dabei in den meisten Fällen die E2-Untereinheit der Pyruvatdehydrogenase (PDH-E2). Bei Personen mit positivem Test auf diese sogenannten Anti-M2-Antikörper besteht eine große Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer PBC, selbst wenn sie keine Anzeichen einer Cholestase und/oder einer Leberentzündung zeigen. Anti-M2-Antikörper liegen bei etwa 95 % aller PBC-Patienten vor.

Indikation

V.a. primär biliäre Zirrhose (PBC)

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3872	450 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 26.23 Euro
EBM	32505	9.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

wöchentlich