

Mitochondrien-AK (Serum)

Stand: 05.09.2017

Synonyme

AMA

Methodeindirekte Immunfluoreszenz, Hand, [NOVA_Lite_ANA_KSL.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		negativ

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Antimitochondriale Antikörper (AMA) können gegen 9 verschiedene mitochondriale Antigene (M1 bis M9) gerichtet sein. Antikörper gegen M2 (AMA-M2), sind die wichtigsten AMA, sie erkennen die E-2 Einheit der Pyruvat-Dehydrogenase des Oxo(Ketosäure)-Dehydrogenase-Komplexes, und sind bei ca. 95 % der Patienten mit primärer biliärer Zirrhose (PBC) nachweisbar.

Indikation

V.a. primär biliäre Zirrhose (PBC)

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3818.H2	290 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 16.90 Euro
EBM	32494	6.00 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

wöchentlich