

Plasminogen Aktivität (Citrat-Plasma)

Stand: 20.03.2023

Einheit: %

MethodeUV-/VIS-Photometrie, COAG, [Berichrom_Plasminogen_2014_02.pdf](#), [Standard_Human_Plasma_2018-02.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		75-150 %

Material

Zitratblut 1:10 Monovette, 5 ml, grün

Beschreibung

Plasminogen ist das Proenzym von Plasmin. Plasmin ist ein proteolytisches Enzym, das als Teil des fibrinolytischen Systems Fibrinogen/Fibringerinnsel auflöst. Erhöhte Plasminogen-Aktivitäten wurden bei Karzinomen und Diabetes mellitus festgestellt. Erniedrigte Konzentrationen, die aus erhöhtem Verbrauch oder aus verminderter Synthese resultieren können, werden bei Leberzirrhose, verbreiteter intravaskulärer Gerinnung (DIC) und therapeutischer Fibrinolyse gefunden.

Indikation

Diagnose und Überwachung von fibrinolytischen Störungen

Spezielle Hinweise

Ein Plasminogenmangel gehört zu den seltenen Risikofaktoren einer Thrombophilie

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3948	140 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 8.16 Euro
EBM	32227	20.70 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)