

Ri (Serum)

Stand: 31.07.2017

Synonyme

ANNA-2

MethodeANNA-Blot, Hand, [DL_1111-4G_A_DE_C04.pdf](#)**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Qualitative Bestimmung von Autoantikörpern gegen Ri. Ri-Ak werden auch ANNA-2 (anti-neuronale nukleäre Antikörper Typ 2) genannt. Sie werden beim Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom gefunden. Sie sind mit dem kleinzelligen Bronchialkarzinom und dem Mammakarzinom assoziiert. Beim Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom treten unregelmäßige, unkontrollierte Bewegungen von Augen (Opsoklonus) und Gliedern (Myoklonus) auf.

Indikation

Verdacht auf paraneoplastisches neurologisches Syndrom (PNS), z.B. bei Patienten mit unklarer Störung der Okulomotorik.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3864	300 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 17.49 Euro
EBM	32505	9.50 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

1x/1-2 Wochen