# Retikulozyten (%, Diff.)

Stand: 24.11.2014

Einheit: %

## Methode

Sysmex-Automat, Zählung eletkrischer Impulse, XN-Serie

## Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

| Geschlecht | max. Alter | Bereich |
|---|---|---|
| M | 4 Woche | s. Ref.liste |
| F | 4 Woche | s. Ref.liste |
| M | | 0.52-1.86 % (Normwert: Alter > 4 Wochen) |
| F | | 0.45-1.78 % (Normwert: Alter > 4 Wochen) |
| | | Referenzwerte ohne Geschlechtsangabe sind nicht verfügbar |

## Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

## Indikation

Beurteilung der erythropoetischen Knochenmarksaktivität

## Spezielle Hinweise

Erhöhte Werte finden sich bei gesteigerter erythropoetischer Knochenmarksaktivität (nach Blutverlust, hämolytische Anämie, Hypoxie, Therapie mit Eisen, Vitamin B12 und Folsäure). Erniedrigte Werte finden sich bei verminderter erythropoetischer Aktivität (megaloblastische-, sideroblastische Anämie, Thalassämie, Zytostatikatherapie)

## Abrechnungsinformation

| Katalog | Ziffer | Wert |
|---|---|---|
| GOAE | 3552 | 70 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 4.08 Euro |

## Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

## Bearbeitung

täglich 24/7