

Rheumafaktor (Serum)

Stand: 20.03.2023

Einheit: IU/ml

MethodeTurbidimetrie, COBAS, [Preciset_RF_202302.pdf](#), [Rheumafakt_2022_03.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

| Geschlecht | max. Alter | Bereich |
|------------|------------|------------|
| | | < 14 IU/ml |

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Rheumafaktoren sind eine heterogene Gruppe von Autoantikörpern, die gegen die antigenen Determinanten am Fc-Teil von IgG-Molekülen gerichtet sind. Sie sind wichtig zur Diagnose der rheumatoiden Arthritis, können aber auch bei anderen nicht-rheumatischen Erkrankungen gefunden werden. Sie kommen darüber hinaus bei verschiedenen nicht rheumatischen Erkrankungen und bei klinisch Gesunden jenseits des 60. Lebensjahres vor. Ungeachtet der Einschränkungen stellt der Rheumafaktornachweis ein diagnostisches Kriterium des American College of Rheumatology zur Klassifizierung der rheumatoiden Arthritis dar. Die Autoantikörper kommen in allen Immunglobulinklassen vor, die üblichen Analysemethoden beschränken sich aber auf den Nachweis der Rheumafaktoren vom IgM-Typ.

Indikation

Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises

Abrechnungsinformation

| Katalog | Ziffer | Wert |
|---------|--------|--------------------------------------|
| GOAE | 3886 | 180 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 10.49 Euro |
| EBM | 32461 | 4.20 Euro |

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)